

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne

Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel :

180 F.



ÉDITION - GRANDES CULTURES

ISSN 0295 - 5776

BULLETIN N° 53 du 12 AOÛT 1988

POMME DE TERRE : - MILDIOU : pas de nouvelles contaminations depuis le dernier bulletin.

MAIS : - PUCERONS : état stationnaire.
- ACARIENS : présence en bordure de parcelle.

BETTERAVE : - MALADIES : situation.

COLZA : protection insecticide - désherbage campagne 88-89.

POMME DE TERRE

MILDIOU

Situation :

Pas de nouvelle contamination enregistrée depuis le 1er août. Les températures élevées (plus de 40°C au niveau de la végétation) ont bloqué le mildiou.

Préconisation :

- Dans les parcelles ou les secteurs indemnes de mildiou, il n'est pas nécessaire d'intervenir.
- Dans les parcelles ou secteurs où existent des foyers de mildiou, intervenir régulièrement avec des contacts.

MAIS

Stade fin fécondation à dessèchement des soies.

PUCERONS

Situation :

Elle est toujours très hétérogène selon les parcelles et les traitements pyrale réalisés. Beaucoup de pucerons (*Rhopalosiphum padi*) sont parasités.

Etat au 8/08/88 dans l'Aube :

Lieu	Témoin	traité liquide	traité granulé
Roncenay	80 % des pieds colonisés dont 10% avec 100 à 1000 pucerons par pied	95 % des pieds colonisés dont 0% avec 100 à 1000 pucerons par pied	100 % des pieds colonisés dont 20% avec 100 à 1000 pucerons par pied
St Germain	55 % des pieds colonisés dont 0 % avec 100 à 1000 pucerons par pied	100 % des pieds colonisés dont 65 % avec 100 à 5000 pucerons par pied	

Préconisation :

Surveiller l'évolution des pucerons jusqu'à la fin de la phase de sensibilité du maïs c'est-à-dire 3 semaines après le début de la fécondation.

Intervenir si plus de 50 % des panicules ou soies est colonisé.

P.136

ACARIENS

Situation :

En bordure de parcelle, particulièrement celles infestées de liseron, on observe sur les feuilles de maïs des acariens.

Préconisation :

Ne pas intervenir. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces parasites.

BETTERAVE

MALADIES

Situation :

Présence principalement de cercosporiose. Attention, les symptômes de cette maladie peuvent être confondus avec ceux de la bactériose qui est souvent rencontrée dans l'Aube (secteur d'Arcis - Luyères - Onjon).

Cercosporiose : petites taches (3 mm) au centre gris argenté avec un cerne fin régulier, couleur lie de vin à brun rougeâtre. A l'humidité (en sachet plastique), ce champignon fructifie bien et on a apparition d'un feutrage grisâtre.

Bactériose : (*Pseudomonas aptata*) taches noires particulièrement le long des nervures. Les nécroses entraînent rapidement un jaunissement et une sénescence du feuillage. Ces symptômes disparaissent par temps chaud et sec.

Très peu de ramulariose. Symptômes d'oïdium signalés uniquement en Brie.

Préconisation :

Effectuer un traitement fongicide si ce n'est déjà fait dès l'apparition des premiers symptômes d'une maladie.

INFORMATION

EN RAISON DES CONGES DU RESPONSABLE DU LABORATOIRE NOUS SOUHAITERIONS QUE LES ENVOIS D'ECHANTILLONS SOIENT REDUITS AU MINIMUM DU 10 AOUT au 12 SEPTEMBRE CETTE MESURE NE CONCERNE PAS LES ANALYSES DE RESISTANCE.

L'ANNUAIRE STATISTIQUE DE 1987 EST SORTI : DEMANDEZ-LE PAR COURRIER OU TELEPHONE AU SRSA CHAMPAGNE-ARDENNE 13, rue Carnot 51000 CHALONS/MARNE
Tél : 26.68.43.33

COLZA

Ci-après, nous vous présentons nos préconisations concernant la protection insecticide d'automne (mouche du chou, grosse altise et charançon du bourgeon terminal) ainsi que des informations sur le désherbage d'automne de cette culture.

RAVAGEURS A L'AUTOMNE ET PROTECTION INSECTICIDE

MOUCHE DU CHOU

LA SITUATION AU COURS DE LA CAMPAGNE 87-88 :

- A l'automne la présence de larves a pu être noté, mais beaucoup moins fréquemment qu'au cours de la campagne précédente. Les parcelles dont la levée a eu lieu à partir du 10-15/9 semis après le 28/8 environ) n'ont pratiquement pas été attaquées. L'effet de la date de semis (ou plus précisément de la date de levée) sur le niveau d'attaque est un fait encore confirmé cette année.
- Au printemps, la situation a été comparable aux années précédentes : présence fréquente de larves en cultures pendant la période du 10-15/5 au 25-30/5. Les quelques sondages réalisés ont montré des niveaux d'attaque d'au moins 50 % de pieds attaqués, avec le plus souvent des attaques superficielles.

LES PRECONISATIONS :

- Au niveau des techniques culturales :

- Lorsque c'est possible, éviter les semis très précoces (qui sont les plus fortement atteints, mais rester dans la période habituellement conseillée pour la région, c'est-à-dire du 28-30/8 au 5-7/9.

Le respect de cette condition est suffisante pour limiter une attaque.

- Au niveau des traitements insecticides :

- Dans le cas de semis précoces (du 20 au 25-27/8 environ) utiliser des insecticides microgranulés localisés dans la raie de semis.

Les spécialités utilisables :

		semis à 34 cm
- LURATER	: 30 à 40 g aux 100 m linéaires	9 à 12 Kg/ha
- COUNTER PLUS	: 33 à 40 g aux 100 m linéaires	10 à 12 Kg/ha
- DELTAX	: 30 à 40 g aux 100 m linéaires	9 à 12 Kg/ha
- DELTANET	: 40 g aux 100 m linéaires	12 Kg/ha
- ONCOL 5G	: 30 à 40 g aux 100 m linéaires	9 à 12 Kg/ha

L'efficacité de cette technique est insuffisante en conditions sèches.

- 3 -

- Les traitements insecticides en pulvérisation sont très irréguliers et de ce fait déconseillés.

- Que penser de l'utilisation de microgranulés mélangés à la semence de colza ?

- Cette technique se développe dans la pratique depuis environ 2 années

. le peuplement colza obtenu a dans l'ensemble une densité et une vigueur comparable à un semis classique.

. l'efficacité sur la mouche du chou est apparue comparable à la localisation des microgranulés, dans le cas de fortes attaques au cours de la campagne 1987-88.

- Par contre :

. la réalisation pratique contraignante peut être un handicap lorsque les semis doivent être réalisés rapidement.

. ce type d'utilisation a lieu actuellement en dehors du cadre de l'homologation, et de ce fait il ne bénéficie peut être pas de toutes les garanties nécessaires (quel microgranulé se mélange avec la semence de colza ? Quel réglage du semoir ? Quelles précautions doit prendre l'utilisateur lors de la réalisation pratique ?).

GROSSE ALTISE ET CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

Au cours de la dernière campagne ces 2 ravageurs ont été très peu importants, et ils ont rarement justifié des applications insecticides.

LES PRECONISATIONS DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE SONT RECONDUITES :

► Utilisation d'un microgranulé localisé dans la raie de semis :

- La protection contre les altises est bonne, mais il faut surveiller les parcelles au moment de la levée si les conditions sont sèches ; dans ce cas une intervention insecticide en pulvérisation peut être nécessaire et elle doit être faite rapidement (morsures dues aux adultes).

- La protection contre le Charançon du bourgeon terminal est insuffisante : elle doit être complétée par une application en pulvérisation en fonction des captures (suivre les Avertissements Agricoles).

- Les spécialités utilisables sont celles citées pour la mouche du chou à la dose faible.

► Utilisation d'un microgranulé mélangé à la semence :

- Au cours des précédentes campagnes l'efficacité vis-à-vis de l'Altise n'a pu être vérifiée.

► Utilisation de traitements en pulvérisation contre les adultes :

- Préférer des spécialités du type pyréthrinolide

- Les efficacités obtenues sont bonnes. Pour positionner les traitements suivre les Avertissements Agricoles, car selon les années, le nombre d'application nécessaire est très variable

► Utilisation de traitements en pulvérisation contre les larves d'Altises et de Charançons du bourgeon terminal :

- C'est une solution de rattrapage

- L'efficacité est irrégulière, et la réalisation pratique difficile

- De telles applications ont rarement été justifiées ces dernières années.

DESHERBAGE

LA TECHNIQUE DE BASE RESTE L'UTILISATION DE DESHERBANTS AU SEMIS (soit en pré-semis, soit en post-semis pré-levée de la culture).

POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE :

Pas de nouveautés (tableau page 4)

Contre la capselle : confirmation de programmes efficaces et sélectifs :

Pré-semis (incorporation)	post-semis (jusqu'à 3 jours après)	Post-levée "cotylédons étalés 1ère feuille pointante du colza"
Tréflan 2,0 l. puis	Butisan 1,5 l.	
Dévrinol 2 à 2,2 l. puis (selon type de sol)	Butisan 1,5 l.	
	Butisan 1,5 l. puis	Butisan 1,5 l.

- La réduction ou le fractionnement de la dose de Butisan, améliore la sélectivité.

- Si l'on craint une forte infestation de capselles, il est préférable de choisir le fractionnement du Butisan.

- Le programme Dévrinol Butisan est le plus complet sur géraniums.

734

- Les herbicides utilisables :

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/Ha de spécialité	O B S E R V A T I O N S
PRE - SEMIS	diallate	AVADEX	3,5 à 4 L	<ul style="list-style-type: none"> . Incorporation immédiate après application . Actif uniquement sur graminées . Dose de 4 L si folle-avoine et repousses céréales
	trifluraline	nombreuses spécialités dont TREFLAN	2,5 L	<ul style="list-style-type: none"> . Incorporation immédiate après épandage . Actif sur graminées, sauf repousses de céréales . Actif sur dicotylédones
	napropamide	DEVRIOL FL	2,2 à 2,8 L	<ul style="list-style-type: none"> . Incorporation superficielle dans les 2 jours (sauf si pluies importantes) . Actif sur graminées : sauf folle-avoine et repousses céréales . Actif sur dicotylédones : dont GAILLETS, MATRICAIRES . La dose de 2,8 L est une dose maximum à n'utiliser qu'en sol argileux (+ 25 % argile) (risque phytotoxicité sur la culture suivante)
	nitralin + napropamide	ZULAN FULTON	2,5 Kg	<ul style="list-style-type: none"> . Incorporation superficielle dans les 2 jours . Actif sur graminées : (proche de napropamide) . Actif sur dicotylédones : dont MATRICAIRES
PRE-SEMI ou PRE-LEVEL	tébutame	COMODOR	4 à 5 L	<ul style="list-style-type: none"> . En pré-semis, incorporation uniquement si sol pierreux . Actif sur graminées : 5 L en pré-semis si risque repousses de céréales . Actif sur dicotylédones
PRE - LEVEL	dimétachlore	TERIDOX	2 à 3 L	<ul style="list-style-type: none"> . Risque de phytotoxicité (surtout en terres légères) utiliser 2 L . Actif sur graminées : sauf folle-avoine, repousses céréales . Actif sur dicotylédones : dont MATRICAIRES, CAPSELLES
	métazachlore	BUTISAN S	2,5 L	<ul style="list-style-type: none"> . A n'utiliser qu'en conditions de semis favorables (préparation de sol, date et profondeur de semis). Même dans ces conditions la sélectivité peut être insuffisante. . Utilisation préférable immédiatement après le semis : possible jusqu'à 3 jours après . Très bonne efficacité herbicide . Actif sur graminées sauf repousses céréales et folle-avoine . Actif sur nombreuses dicotylédones : dont MATRICAIRES, CAPSELLES
POST-LEVEL PRECOCE	métazachlore	BUTISAN S	3 L	<ul style="list-style-type: none"> . A utiliser dès le stade "cotylédons étalés-1ère feuille pointante du colza" . La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles . Ce type d'utilisation est efficace sur : CAPSELLES